

# TECNOGRIP PLUS

Comprimidos  
Jarabe

ANTIGRIPIAL  
DESCONGESTIVO  
ANTITUSIVO

**COMPOSICION:** Cada **TECNOGRIP PLUS comprimido** contiene:

Clorhidrato de D-isoefedrina .....60 mg;  
Clorfeniramina maleato .....2 mg;  
Dextrometorfan ..... 15 mg;  
Paracetamol ..... 500 mg;  
Excipientes c.s.p. ....1 comprimido recubierto.

Cada 5ml de **TECNOGRIP PLUS jarabe** contiene:

Clorhidrato de D-isoefedrina .....30 mg;  
Clorfeniramina maleato .....2 mg;  
Dextrometorfan HBr ..... 10 mg;  
Paracetamol .....125 mg;  
Excipientes .....c.s.

## FARMACOLOGIA:

**TECNOGRIP PLUS** es un eficaz preparado que logra el rápido alivio de todos los molestos síntomas de las infecciones virósicas (gripe, resfrío) y de otras afecciones congestivas como: la congestión de las vías aéreas superiores y de los ojos, la tos, la rinorrea, la ronquera, el dolor generalizado del cuerpo y de las articulaciones, la fiebre, etc.

En su cuidadosamente estudiada formulación farmacológica se encuentran:

**EI PARACETAMOL** es el principal derivado paraminofenólico, eficaz analgésico y antipirético, recomendado por la OMS por su alto rango de tolerancia además de producir una sensación de bienestar y brindar una ligera acción protectora de la mucosa gástrica por no tener acción antiprostaglandínica.

**La CLORFENIRAMINA** es un potente antihistamínico con acción antiespasmódica bronquial que disminuye la congestión nasal, la rinorrea y el estornudo.

**EI CLORHIDRATO DE D-ISOEFEDRINA (Pseudoefedrina)** pertenece al grupo de las aminas simpaticomiméticas con acción estimulante sobre el receptor adrenérgico. Actúa como descongestivo al producir una vasoconstricción de las mucosas, disminuyendo la secreción y el edema.

**EI DEXTROMETORFAN** posee marcado efecto antitusivo elevando el umbral del centro de la tos en el hipotálamo y sedante laringeo que sinérgicamente con los demás componentes proporcionan sensación de bienestar y alivio al paciente.

**TECNOGRIP PLUS** en la dosis recomendada posee pocos efectos secundarios. En personas sensibles puede producir taquicardia, somnolencia, mareos y sequedad bucal que desaparecen al disminuir o suspender la medicación.



**MOT**  
**MEDITEC**  
División de EMEPAR S.R.L.

Durazno Nº 1615 c/ Paz del Chaco - Tel./Fax: 021 300122 - Lambaré, Paraguay  
www.meditec.com.py e-mail: meditec@meditec.com.py

## INDICACIONES:

Afecciones respiratorias virósicas y congestivas de diferentes causas:

- Gripe;
- Resfriado común;
- Rinitis aguda o crónica;
- Faringitis;
- Laringitis;
- Traqueobronquitis.

## CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a algunos de sus componentes
- Pacientes con tratamientos con inhibidores de la MAO.
- Embarazo y lactancia
- **Tecnogrip Plus comprimidos** está contraindicado en niños menores de 12 años.
- **Tecnogrip Plus jarabe** está contraindicado en niños menores de 2 años.

## REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES:

- A dosis excesiva puede producir confusión, excitación, nerviosismo, inquietud o irritabilidad no habituales. Depresión respiratoria.
- Raros casos de reacciones cutáneas que desaparecen al suspender el tratamiento.
- Pueden observarse, aunque raramente, sequedad bucal y retención urinaria.

## RESTRICCIONES DE USO:

- Considerar en los deportistas que el clorhidrato de d-isoefedrina puede dar reacción positiva en los test de control antidopaje
- Como todos los productos que contienen simpaticomiméticos usar con precaución en pacientes con angina de pecho, hipertiroidismo, diabetes, hipertensión arterial y psicosis.
- Utilizar con cuidado en pacientes con asma o insuficiencia hepática.

## MODO DE EMPLEO Y POSOLOGIA:

**COMPRIMIDOS:** 1 comprimido cada 8 ó 6 horas según necesidad.

## JARABE:

- **menores de 5 años:** 2,5 ml c/8 ó 6 horas;
- **de 5 a 12 años:** 5 ml c/8 ó 6 horas;
- **mayores de 12 años y adultos:** 10 ml c/8 ó 6 horas.

## INTERACCIÓN CON MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS:

- No utilizar conjuntamente con otros fármacos que deprimen el sistema nervioso central como: tranquilizantes, barbitúricos o alcohol.
- Los IMAO pueden producir excitación, hipotensión y aumento del apetito.
- Disminuyen el metabolismo hepático del Dextrometorfan, la Quinidina, la Amiodarona, la Fluoxentina, el Haloperidol, la Paroxetina, la Propafenona y la Tioridazina.
- El Clorhidrato de d-isoefedrina puede antagonizar el efecto hipotensor de la guanetidina, metil dopa y beta bloqueantes.

## SOBREDOSIS (Signos, Síntomas, Conducta y Tratamiento):

La sobredosis, puede producir síntomas gastrointestinales como: Náuseas, vómitos y diarreas. Se debe inducir el vómito o llevar a cabo el lavado gástrico luego de la administración de carbón activado o un laxante activo por osmosis (sulfato de sodio). Deberá mantenerse el equilibrio de líquidos y de electrolitos. En caso de sobredosis recurrir a Emergencias Médicas: Avda. General Santos Teléfono: 206 206 o al Centro Nacional de Toxicología: Avda. General Santos y Teodoro S. Mongelós. Teléfono: 418 420.

**PRESENTACION:** Caja con 12 comprimidos recubiertos;  
Sobre con 4 comprimidos recubiertos;  
Frasco con 120 ml de jarabe.

## Venta bajo receta

Elaborado por Lab. INDUFAR C.I.S.A.  
Calle Anahí e/ Zaavedra y Bella Vista - Fndo. De la Mora.  
Regente: Q.F. Dr. Humberto Simón - Reg. Nº 535  
Para MEDITEC, división EMEPAR S.R.L.  
Regente: Q.F. César Paredes - Reg. Prof. Nº 4.055  
Especialidad Medicinal autorizada por el M.S.P. y B.S.